



Urineonderzoek ziekte van Cushing

Uw hond lijdt naar alle waarschijnlijkheid aan de ziekte van Cushing. Om de diagnose te bevestigen en de onderliggende oorzaak beter te kennen (dit kan namelijk invloed hebben op de behandeling en de vooruitzichten) gaat u urinestalen verzamelen.

Naast deze brief krijgt u van ons mee:

- drie gemarkeerde buisjes voor het verzamelen van de urine van uw hond.
- medicatie welke gebruikt gaat worden voor de diagnosestelling.

Instructies voor het opvangen en bewaren van de urine.

U verzamelt de urinemonsters zelf thuis (ivm stressreductie!). Gedurende drie ochtenden vangt u ochtend urinestalen (3 ml) op. Neem deze urine telkens op exact hetzelfde tijdstip 's ochtends. Let op: uw hond dient elke avond voor staalname uitgelaten te worden op hetzelfde tijdstip.

Ná het nemen van het 2e urinestaal geeft u 3 maal dexamethason (0,1mg/kg in de mond) om de 8 uur. Dit is de medicatie die u heeft meegekregen; u volgt de dosering op de bijsluiter. De eerste toediening is direct ná het nemen van het 2e urinestaal.

De verzamelde urinestalen dienen *in koelkast* te worden bewaard.

Let op:

Aangezien de monsters niet in het weekend in ontvangst kunnen worden genomen en niet kunnen worden verzonden start u best niet op donderdag of vrijdag met het opvangen van de urinemonsters!

Extra informatie:

Voor deze test hoeft de urine van uw hond niet nuchter te worden opgevangen. Als er ook overige onderzoeken zullen plaatsvinden is dit vaak wel noodzakelijk. Indien u hier niet zeker van bent, overleg dan altijd nog even met de praktijk! Wij kunnen u hier mee verder helpen.

